

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคแบคทีเรียกินเนื้อในผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคแบคทีเรียกินเนื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อุดรธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อจากแพทย์เจ้าของไข้ เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย และ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 216 คน รวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือน มีนาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2567 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 4 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรุนแรงของโรค แบบประเมินความรู้เรื่องโรคแบคทีเรียกินเนื้อ และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไคสแคว์ และสถิติพหุคูณดอยโลจิสติกส์

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 216 รายส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 56 อายุเฉลี่ย 54.23 ตำแหน่งที่เป็นบริเวณเท้าและสันเท้า คิดเป็นร้อยละ 78.2 ความรุนแรงของโรกระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 70.8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคแบคทีเรียกินเนื้อ สาเหตุที่ทำให้เกิดแผล ระยะเวลาการเจ็บป่วยก่อนมาโรงพยาบาล จำนวนวันนอนโรงพยาบาล ความรู้เรื่องโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเองระยะเวลาการเจ็บป่วยก่อนมาโรงพยาบาล

ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และภาวะเจ็บป่วยรุนแรง

คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อ , ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Title: Factors related to the severity in Patients with necrotizing Fasciitis admitted at surgical wards Udonthani Hospital

Abstract

This cross-sectional descriptive research aimed to study the factors related to the severity of necrotizing fasciitis in patients admitted to Udon Thani Hospital. The sample consisted of 216 patients diagnosed with necrotizing fasciitis by their attending physician and admitted to surgical wards of Udon Thani Hospital. Data were collected between March 2024 and July 2024. The instruments used for data collection consisted of 4 parts: a general information questionnaire, a disease severity assessment form, a knowledge assessment form on necrotizing fasciitis, and a patient self-care behavior questionnaire. The reliability of the instruments was analyzed using the Cronbach's alpha coefficient of 0.93. Data were analyzed using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, Chi-squared correlation analysis, and logistic regression. The results of the research found that most of the 216 samples were male (56%), with an average age of 54.23%, and site of infection lower leg (78.2%). The severity of the disease was level 2 (70.8%). Factors related to the severity of necrotizing fasciitis Causes of wounds, duration of illness before hospitalization, days admission, knowledge about the disease and self-care behaviors of patients

The data from this study were used to develop an effective nursing care system for patients with necrotizing fasciitis in order to plan appropriate patient care to help reduce complications and severe illness.

Keywords: patients with necrotizing fasciitis, related factors