

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล

ประจำปีการศึกษา 2568

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร ล้อธรรมมา
 ภาควิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 เวลาให้บริการ เดือน มิ.ย. - ก.ย. 68 เวลา 08:00-16:00 น.
 ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์

เป้าหมาย

พัฒนาความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูก
 ด้วยนมกัด

ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการของสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ความเป็นมา

การเกิดบาดแผลจากอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุจากการทำงาน หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน สิ่งที่มีมักจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ "บาดแผล" (Wounds) ซึ่งมีตั้งแต่รอยถลอกตื้นๆ แผลฉีกขาด แผลถูกของมีคมบาด ไปจนถึงแผลฉกรรจ์ที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตแม้ว่าร่างกายมนุษย์จะมีกลไกตามธรรมชาติในการซ่อมแซมตัวเอง แต่การปล่อยให้บาดแผลหายเองโดยขาดการดูแลและปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี มักนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ดังนั้น การดูแลบาดแผลจากอุบัติเหตุอย่างถูกต้องและทันท่วงที จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ยังมีบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัดที่ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ การดูแลบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัดจึงไม่ใช่เพียงแค่การติดพลาสเตอร์หรือการห้ามเลือดให้หยุดไหลเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการทางสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ไปจนถึงการดูแลแผลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความสูญเสีย และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะการดูแลบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัด (เช่น สุนัข แมว หรือแม้กระทั่งคน) มีความพิเศษและเสี่ยงกว่าแผลอุบัติเหตุทั่วไป เนื่องจากในน้ำลายของสัตว์เหล่านี้มีเชื้อแบคทีเรียอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีความเสี่ยงต่อ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งอันตรายถึงชีวิต การดูแลบาดแผลจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.การป้องกันการติดเชื้อ (Prevention of Infection) เนื่องจากบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุมักจะมาพร้อมกับความสกปรก เชื้อโรค แบคทีเรีย หรือสิ่งแปลกปลอมจากสิ่งแวดล้อม (เช่น ดิน ทราย สนิม) หากไม่ได้รับการล้างทำความสะอาดและการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี

เชื้อโรคเหล่านี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การอักเสบ เป็นหนอง และในกรณีที่รุนแรง เชื้ออาจเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ 2. การส่งเสริมกระบวนการหายของแผล (Promotion of Wound Healing) การดูแลแผลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสม การรักษาความชุ่มชื้นที่พอดี และการลดแรงกระแทกบริเวณแผล จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาตัว และทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น 3. การลดการเกิดแผลเป็นและความพิการ (Minimizing Scarring and Deformity) บาดแผลที่ได้รับการเย็บ การแต่งขอบแผล หรือการดูแลอย่างถูกวิธีโดยบุคลากรทางการแพทย์ จะช่วยลดการสร้างเนื้อเยื่อพังผืดที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของแผลเป็นนูน (Keloid) หรือแผลหดรั้ง โดยเฉพาะบาดแผลบริเวณข้อต่อหรือใบหน้า การดูแลที่ดีจะช่วยรักษาทั้งฟังก์ชันการทำงานของอวัยวะและความสวยงามทางกายภาพไว้ได้ และ 4. การบรรเทาความเจ็บปวด (Pain Management) บาดแผลจากอุบัติเหตุมักสร้างความทุกข์ทรมานใจและกายให้กับผู้ป่วย การล้างแผลอย่างเบามือ การใช้วัสดุปิดแผลที่ไม่ติดเนื้อแผล รวมถึงการประเมินเพื่อรับยาแก้ปวดอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความทรมานและส่งเสริมสภาพจิตใจที่ดีให้กับผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลและปฐมพยาบาล แผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ และแผลที่เกิดจากการถูกสัตว์กัด ประกอบด้วยล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่ (Crucial Step) ในการลดปริมาณเชื้อโรค และไวรัสพิษสุนัขบ้า โดยให้รีบนำแผลไปผ่านน้ำสะอาดไหลผ่าน (เปิดจากก้นโดยตรง) ใช้สบู่ฟอกและขัดถูเบาๆ ให้ลึกถึงก้นแผลอย่างน้อย 10-15 นาที หากมีเนื้อตายหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ ให้พยายามล้างออกให้หมด การเช็ดแผลและใส่ยาฆ่าเชื้อซ้ำแผลให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือสำลี sterile เช็ดรอบๆ แผลด้วยแอลกอฮอล์ 70% การทายาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน (Povidone-iodine) หรือทิงเจอร์ไอโอดีน เข้าไปในบาดแผลเพื่อทำลายเชื้อโรค การห้ามเลือดและปิดแผลเบื้องต้นหากแผลมีเลือดออก ให้ใช้ผ้าสะอาดกดนิ่งๆ เพื่อห้ามเลือด

การปิดแผลด้วยผ้าก๊อชสะอาดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอก โดยผู้ป่วยที่ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ควรไปพบแพทย์ทุกกรณี เพื่อประเมินและรับการรักษาโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากสัตว์ที่กัดไม่มีประวัติฉีดวัคซีนชัดเจน เป็นสัตว์จรจัด หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ แพทย์จะเริ่มฉีดวัคซีนทันที (และอาจรวมถึงการฉีดเซรุ่ม หรือ RIG บริเวณรอบบาดแผลในกรณีที่แผลมีความเสี่ยงสูง) และการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก: หากผู้ป่วยไม่ได้รับวัคซีนบาดทะยักกระตุ้นภายใน 5-10 ปีที่ผ่านมา แพทย์จะทำการฉีดกระตุ้นให้ การรับยาปฏิชีวนะ (Antibiotics): เนื่องจากแผลสัตว์กัด โดยเฉพาะ "แมวกัด" มักมีเชื้อที่เล็กและลึก ทำให้เชื้อแบคทีเรีย (เช่น *Pasteurella multocida*) ฝังลึกใต้ผิวหนัง แพทย์มักจะจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อทานป้องกันการติดเชื้อ การแนะนำให้ความรู้เรื่องการสังเกตอาการและสัตว์ที่กัดสังเกตอาการของสัตว์ (ถ้าทำได้): หากเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ ให้กักขังและสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสัตว์ยังปกติ ยืนยันได้ว่าปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า แต่ระหว่างที่สังเกตอาการ ผู้ถูกกัดต้องไปฉีดวัคซีนตามนัดห้ามรอให้ครบ 10 วัน

สังเกตอาการแผลติดเชื้อ หากแผลมีอาการบวม แดง ร้อน ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ มีหนองไหล หรือมีไข้ขึ้น ควรรีบกลับไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเนื้อเยื่อส่วนลึกอักเสบ (Cellulitis) ได้ครับ

จากการปฏิบัติงานพบว่าผู้ป่วยที่เกิดบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกั๊ด มีพฤติกรรมการดูแลบาดแผลไม่เหมาะสม และไม่มารับการฉีดยาตามนัด โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุพบอุบัติการณ์ติดเชื้อ และการอักเสบของบาดแผลภายหลังร้อยละ 45 และผู้ป่วยที่มีบาดแผลสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกั๊ดมาฉีดยาไม่ตรงตามนัดร้อยละ 60 จากปัญหาของผู้ป่วยทำให้ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผล (Promotion of Wound Healing) เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสูญเสียอวัยวะ เพิ่มขึ้นตอนและระยะเวลาในการดูแลบาดแผลผู้ป่วย รวมทั้งเวชภัณฑ์ยา และวัคซีนที่ใช้ในการดูแล

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ป่วยการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกั๊ด

วัตถุประสงค์เพื่อ

- 1.ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกั๊ดได้ถูกต้องร้อยละ 90
- 2.ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกั๊ดเข้ารับการฉีดยาตามนัดร้อยละ 100
- 3.อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกั๊ดลดลงร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกั๊ดมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อลดลง
2. ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกั๊ดมีความรู้ และความตระหนักในการดูแลบาดแผลตนเองเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 2 การทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ตามความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ/ หน่วยให้บริการ	วัตถุประสงค์ (เน้นการดูแลผู้ป่วย)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์ที่เกิดกับผู้รับบริการ)	ผลที่เกิดขึ้นนำไปพัฒนา
เพื่อเพิ่มความ เชี่ยวชาญการ พยาบาลผู้ป่วยการ พยาบาลผู้ป่วยที่มี บาดแผลจาก อุบัติเหตุ และ บาดแผลที่เกิดจาก สัตว์เลื้อยลูกด้วยนม กัด/หอยผู้ป่วย อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาล อุตรดิตถ์	1.ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการ ดูแลบาดแผลที่เกิดจาก อุบัติเหตุ และบาดแผลที่ เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วย นมกัดได้ถูกต้องร้อยละ 90 2.ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิด อุบัติเหตุ และที่เกิดจาก สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนตาม นัดร้อยละ 100 3.อัตราการติดเชื้อของ ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิด อุบัติเหตุ และที่เกิดจาก สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัด ลดลงร้อยละ 80	1.ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูก ด้วยนมกัดมีภาวะแทรกซ้อนจากการ ติดเชื้อลดลง 2.ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูก ด้วยนมกัดมีความรู้ และความ ตระหนักในการดูแลบาดแผลตนเอง เพิ่มมากขึ้น	การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการรักษาโรค เบื้องต้นสำหรับพยาบาล บทที่ 4 การทำหัตถการ พื้นฐานในการรักษาโรค เบื้องต้น และการดูแล บาดแผลในผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

ส่วนที่ 3 การทำแบบบันทึกผลการทำ Faculty Practice รายบุคคล

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร ล้อธรรมมา

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัด

หน่วยให้บริการ: แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2. เป้าหมาย (เน้นการเพิ่มพูนสมรรถนะของอาจารย์)

พัฒนาความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัด

3. เวลาการนำความเชี่ยวชาญไปให้บริการ

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 - ก.พ. 2569 เวลา 17:00-18:00 ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์

4. บันทึกการให้บริการตามความเชี่ยวชาญ

การให้บริการตามความเชี่ยวชาญ	วัตถุประสงค์ (เน้นการดูแลผู้ป่วยและเน้นผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีขึ้น)	การปฏิบัติการพยาบาล (Direct Care หรือ Consultation กับพยาบาล)	ผลจากการให้บริการ (ประโยชน์ที่เกิดกับผู้รับบริการ)	ผลที่เกิดขึ้นนำไปพัฒนา
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัดแต่เดิมแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ใช้แนวทางการดูแลบาดแผลตามปกติตาม และอธิบายตามใบนัดของโรงพยาบาล	1.ผู้ป่วยมีพฤติกรรม การดูแลบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัดได้ถูกต้องร้อยละ 90 2.ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัดเข้ารับ การฉีดวัคซีนตามนัดร้อยละ 100	ขั้นตอนการล้างแผลที่ถูกต้องช่วยให้แผลหายไวและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ 1.เตรียมอุปกรณ์ และทำความสะอาดมือ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เตรียมอุปกรณ์ เช่น น้ำเกลือล้างแผล, แอลกอฮอล์ 70%, ยาฆ่าเชื้อ (เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน	1.ผู้ป่วยมีพฤติกรรม การดูแลบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัดได้ถูกต้องประเมินจากการสอบถามผู้ป่วย ในการมารับบริการ ทำแผลแต่ละครั้ง เกี่ยวกับวิธีการดูแลบาดแผล และการเข้ารับการทำแผลตามนัดหมาย	การจัดการเรียนการสอน 1. พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมกัด

4. บันทึกการให้บริการตามความเชี่ยวชาญ

การให้บริการตามความเชี่ยวชาญ	วัตถุประสงค์ (เน้นการดูแลผู้ป่วยและเน้นผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีขึ้น)	การปฏิบัติการพยาบาล (Direct Care หรือ Consultation กับพยาบาล)	ผลจากการให้บริการ (ประโยชน์ที่เกิดกับผู้รับบริการ)	ผลที่เกิดขึ้นนำไปพัฒนา
เหตุผลที่ต้องใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด และมีการติดตามในระบบทีมและออนไลน์ช่วยให้การให้ความรู้ในการดูแลบาดแผลผู้ป่วย การสังเกตความผิดปกติของบาดแผล การติดตามการฉีดวัคซีนตามนัด ของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	3.อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดลดลงร้อยละ 80	2.ทำความสะอาดรอบบาดแผล: ใช้ผ้าก๊อชชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดทำความสะอาดผิวหนัง รอบๆ แผล ห้ามเช็ดลงบนแผลโดยตรง เพราะจะทำให้เนื้อเยื่อเสียหายและแสบแผล 3.ซับแผลให้แห้ง: ใช้ผ้าก๊อชแห้งที่สะอาดซับบริเวณรอบๆ แผลให้แห้งสนิทใส่ยาฆ่าเชื้อ: ทายาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน บางๆ บริเวณบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 80 2.ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่เกิดอุบัติเหตุ และที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดร้อยละ 100 จากการให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 - ก.พ. 2569 เวลา 17:00-18:00 ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ จำนวนผู้ป่วย 96 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัด ร้อยละ 100	2.จัดทำคู่มือ "แนวปฏิบัติเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด พัฒนาหัวข้อวิจัย 1.การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด การประเมินความผิดปกติ และการติดตามนัด วัคซีนโดยใช้ระบบออนไลน์

การให้บริการ ตามความ เชี่ยวชาญ	วัตถุประสงค์ (เน้นการดูแล ผู้ป่วยและเน้น ผลลัพธ์ทางการ พยาบาลที่ดีขึ้น)	การปฏิบัติการ พยาบาล (Direct Care หรือ Consultation กับ พยาบาล)	ผลจากการให้บริการ (ประโยชน์ที่เกิดกับ ผู้รับบริการ)	ผลที่เกิดขึ้นนำไป พัฒนา
เนื่องจากผู้ป่วย ภายหลังได้รับ การทำแผลแล้ว ต้องกลับไปดูแล บาดแผลเองที่ บ้าน และต้อง กลับมาฉีดวัคซีน ตามนัด ผู้ป่วยจึง ต้องมีความรู้ และความ ตระหนักในการ ดูแลบาดแผล ตนเอง การ สังเกตความ ผิดปกติ และการเข้ารับ การฉีดวัคซีน ตามนัด		ปิดบาดแผล: ใช้ผ้าก๊อซ ปิดทับแผลและยึด ด้วยพลาสติกให้ เรียบร้อย ควหลีกเลี่ยง การใช้สาลีปิดแผล โดยตรงเพราะอาจติด แผลได้ การฉีดวัคซีน บาดทะยักจำเป็น สำหรับทุกคน เพื่อ ป้องกันโรคบาดทะยักที่ อันตรายถึงชีวิต โดยทั่วไปแล้วควรฉีด เข็มกระตุ้นทุก ๆ 10 ปี หรือฉีดทันทีเมื่อเกิด บาดแผลที่มีความเสี่ยง สูง ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยฉีดมา ก่อน: ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็มเข็มที่ 1: ฉีดทันที. เข็มที่ 2: ห่างจากเข็ม แรก 1 เดือน.เข็มที่ 3: ห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน	3.อัตราการติดเชื้อของ ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่ เกิดอุบัติเหตุ และที่เกิด จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมก่ดลดลงจำนวน ผู้ป่วย 96 ราย เข้ารับ การดูแลบาดแผล ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 - ก.พ. 2569 เวลา 17:00- 18:00 ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ไม่พบผู้ป่วย ติดเชื้อ	

การให้บริการ ตามความ เชี่ยวชาญ	วัตถุประสงค์ (เน้นการดูแล ผู้ป่วยและเน้น ผลลัพธ์ทางการ พยาบาลที่ดีขึ้น)	การปฏิบัติการ พยาบาล (Direct Care หรือ Consultation กับ พยาบาล)	ผลจากการให้บริการ (ประโยชน์ที่เกิดกับ ผู้รับบริการ)	ผลที่เกิดขึ้นนำไป พัฒนา
		การฉีดวัคซีนพิษสุนัข บ้าแบ่งเป็น 2 กรณี หลัก คือ ฉีดหลังสัมผัส โรค (โดนกัด/ข่วน) ซึ่ง ต้องรีบฉีดเข็มแรกให้ เร็วที่สุด (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) โดยฉีดทั้งหมด 5 เข็ม (วันที่ 0, 3, 7, 14, 28) และ ฉีดก่อน สัมผัสโรค (เพื่อ ป้องกัน) ฉีด 3 เข็ม (วันที่ 0, 7, 21 หรือ 28)		

ส่วนที่ 4 สรุปผลและการพัฒนา

มีรายงานกระบวนการและแสดงหลักฐานผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

1. แผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ในสาขาที่รับผิดชอบ และการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามแผน

- มีแผนการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัดที่มีประสิทธิภาพ
- ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลในการเข้าปฏิบัติงานและใช้อุปกรณ์

2. การจัดการผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์

สามารถนำมาพัฒนาเป็นคู่มือเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัดที่มีประสิทธิภาพและการนำมาพัฒนาในปีต่อไป รวมถึงการพัฒนาระบบออนไลน์สำหรับติดตามประเมินบาดแผล และรับวัคซีนผู้ป่วย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการพยาบาลให้ดีขึ้น

3. การใช้ความรู้จากการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ/วิจัย

- พัฒนาเนื้อหาการสอนเรื่องการดูแลการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัดที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัด การประเมินความผิดปกติ และการติดตามนัดวัคซีนโดยใช้ระบบออนไลน์

4. ทบทวนการดำเนินงานและนำมาปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

จากผลของการปฏิบัติการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญในปีการศึกษา 2568 พบว่าแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัดที่มีประสิทธิภาพดังนั้นในปี 2569 จึงได้วางแผนขยายผลไปยังการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัด โดยใช้ระบบออนไลน์ต่อไป

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการให้บริการตามความเชี่ยวชาญและแนวทางการพัฒนา

รวมชั่วโมงให้บริการตามความเชี่ยวชาญ 90 ชั่วโมง

1. อาจารย์และทีมพยาบาลแผนกฉุกเฉิน ร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัด
2. ได้พัฒนาวิธีการและเนื้อหาการสอนเรื่องปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัด
3. ได้เห็นสถานการณ์จริงที่นำไปพัฒนาการสอนการพยาบาลเรื่องปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัด
4. ได้พัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยงานวิจัยเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ และบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมกัด การประเมินความผิดปกติ และการติดตามนัดวัคซีนโดยใช้ระบบออนไลน์

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร ล้อธรรมมา

ลงนาม

หัวหน้าสาขาผู้ลงนามรับรอง

ลงนาม